

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

DLP 12-8-85546869

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

- EDITION GENERALE -

N° 20 - 1^{er} AOÛT 1985

VIGNE

BOTRYTIS :

La lutte contre cette maladie fait l'objet d'une méthodologie ayant pour but de réduire le nombre de traitements à appliquer, en tenant compte des risques encourus eux-mêmes fonction des conditions climatiques.

Aucun traitement n'a été préconisé jusqu'au 18 juillet. A cette date, une application fongicide, une dizaine de jours avant véraison, a été conseillée dans les vignes qu'on désire protéger. Il est donc urgent de traiter, si cela n'a pas été fait.

MILDIU :

Le traitement de couverture a été conseillé dès les 18 et 24 juillet. Les conditions climatiques actuelles (pluies du 29 et 30 juillet) favorisant l'extension de la maladie, justifient cette intervention.

ACARIENS :

La présence importante de ces ravageurs a été signalée début juillet. Le traitement a été conseillé de manière impérative (bulletin n°16 du 2 juillet). La recrudescence des acariens ces derniers jours, est constatée, notamment dans le département de l'Hérault (Bitte-rois et Montpellier).

L'application d'un acaricide est recommandée, et si nécessaire en changeant de produit. Il convient de bien mouiller l'ensemble du feuillage, en multipliant par exemple les passages. Rappelons que les fortes attaques sont préjudiciables à la qualité (par exemple sur Merlot et Tempranillo).

EUDÉMIS :

Le 3^{ème} vol a débuté dans les situations précoces (dès le 28 juillet).

DESSÈCHEMENT DE LA RAFFLE :

Cet accident, signalé localement, peut être combattu au moment de la véraison. Deux applications à dix jours d'intervalles à base de chlorure de calcium et chlorure de magnésium (0,5 %) permettent de diminuer la sensibilité à l'accident. Il existe des formulations préparées.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42



CULTURES LEGUMIERES

2 / -

MELON

MILDIOU :

Renouveler la protection (voir bulletin n°19 du 24 Juillet).

ASPERGE

STEMPHYLIUM :

Les pluies récentes ont entraîné une baisse des températures. Si ces dernières descendent vers 22° - 25° et si une forte hygrométrie persiste des attaques importantes sont à craindre. Intervenir dès réception avec l'un des produits suivants :

chlorothalonil	150 g m.a./hl	Daconil
iprodione	75 g m.a./hl	Rovral
mancozèbe	300 g m.a./hl	Nombreuses spécialités
manèbe	300 g m.a./hl	" "

Renouveler le traitement 15 jours plus tard.

CHENILLE À FOURREAU :

Des sorties de papillons sont encore observées, les éclosions sont prévues entre le 15 et 20 août. Dans les zones sensibles ne pas relâcher la protection. Ne traiter que la base des turions et non l'ensemble de la plante, 2000 à 2500 l de bouillie/ha sont nécessaires.

CHOU

PIÉRIDES :

Depuis plusieurs jours les vols sont importants et de nombreuses pontes et quelques chenilles ont été observées. Surveillez vos cultures et si nécessaire utiliser :

deltaméthrine	0,75 g m.a./hl	Décis
cyperméthrine	3 g m.a./hl	Ripcord, Kafil, Cymbush

efficaces également contre les noctuelles.

AUBERGINES - HARICOTS

ACARIENS :

Ils sont très nombreux aussi bien sur aubergines que sur haricots entraînant une chute du feuillage.

Renouveler la protection (voir bulletin n°18 du 9 juillet).

TOMATE

ALTERNARIA :

Plusieurs fruits principalement des tomates de conserve présentent des taches d'alternaria. Utiliser :

chlorothalonil	150 g m.a./hl	Daconil
----------------	---------------	---------

efficace également contre le mildiou. Délai avant récolte 7 jours.

NÉCROSE APICALE :

Ce phénomène est observé dans de nombreuses cultures aussi bien palissées qu'en plein champ. Dans la majorité des cas ce sont des cultures de tomates où l'irrigation n'a pas été régulière. Hygrométrie basse, fortes températures, alimentation en eau irrégulière = nécrose apicale ou cul noir.